



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO contenente le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 21 maggio 2009 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 19 aprile 2013, con il quale è stato registrato al n. 13126 il prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO, contenente le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf, a nome dell’Impresa BASF Italia SpA, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrata dal Consorzio Basilico Genovese D.O.P., con la quale si propone di attivare una procedura d’urgenza per l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario CABRIO DUO sulla coltura basilico in campo, per combattere i danni provocati dall’avversità *Peronospora belbahrii*;

VISTA la richiesta presentata il 16 febbraio 2015 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura basilico in campo, per la lotta contro l’avversità *Peronospora belbahrii*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

VISTO il parere favorevole degli esperti della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura basilico in campo, per la lotta contro l’avversità *Peronospora belbahrii*, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario in questione, acquisiti con procedura telematica;

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura basilico in campo, per la lotta contro l'avversità *Peronospora belbahrii*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO registrato al n. 13126 in data 21 maggio 2009 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 19 aprile 2013, a nome dell'Impresa BASF Italia SpA, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li

1.2. MAG. 2015



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe RUOCCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Ruocco", written over the printed name.

SR

GP

CABRIO® DUO

Fungicida
Concentrato Emulsionabile (EC)

CABRIO® DUO

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

PYRACLOSTROBIN puro g 3,8 (=40 g/l)

DIMETOMORF puro g 6,9 (=72 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: alcool benzilico, nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può essere

mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirarne i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **IN CASO DI INGESTIONE:** contattare immediatamente un CENTRO

ANTIVELENI o un medico. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Raccogliere il materiale fuoriuscito. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Sciacquare la bocca. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1

Officine di produzione

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania

BASF Espanola S.A. - 43006 Tarragona, Spagna

BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay, Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. 13126 del 21/05/09

Contenuto netto: 1 - 2,5 - 4 - 5 - 10 l

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRACLOSTROBIN 4% e DIMETOMORF 7,2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DIMETOMORF: Terapia sintomatica. PYRACLOSTROBIN: Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali (per tutti gli impieghi in pieno campo).

CARATTERISTICHE TECNICHE: Cabrio Duo contiene le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf le quali appartengono a due famiglie chimiche distinte e presentano un diverso meccanismo d'azione. Cabrio Duo è prevalentemente indicato per il controllo di peronospora ed alternariosi delle colture da orto autorizzate.



PERICOLO

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

| Coltura | Malattia | Dose ml/ha | Dose l/ha | Intervallo tra i tratt. (giorni) | N° massimo tratt. all'anno |
|--|---|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| Pomodoro in pieno campo e serra | Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>) | 200-250 | 2 - 2,5 | 7-10 | 3 |
| Patata in pieno campo | Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>) | 200-250 | 2 - 2,5 | 7-10 | 3 |
| Cetriolo, cetriolino e zucchini in pieno campo e serra | Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200-250 | 2 - 2,5 | 7-10 | 3 |
| Cetriolo, cetriolino e zucchini (in serra) | Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 250 | 2,5 | 7-8 | 3 |
| Melone in pieno campo | Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), alternariosi (<i>Alternaria cucumerina</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria spp.</i>) | 200-250 | 2 - 2,5 | 7-10 | 3 |
| Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) in pieno campo e serra | Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) | 200 | 2 | 7-10 | 3 |
| Basilico in pieno campo | Peronospora (<i>P. belbahrii</i>) | 200-250 | 2-2,5 | 7-10 | 3 |
| Cipolla, aglio e scalogno in pieno campo | Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>) | 200-250 | 2 - 2,5 | 7-10 | 3 |
| Carciofo pieno campo | Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Ascochitiosi (<i>Ascochyta hortorum</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) | 250 | 2,5 | 7-10 | 3 |
| Melanzana pieno campo e serra | Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) | 250 | 2,5 | 7-10 | 3 |

Cabrio Duo possiede anche un effetto collaterale contro il cancro gommoso delle cucurbitacee (*Didymella bryoniae*).

► Non applicare Cabrio Duo più di 2 volte consecutive e per un massimo di 3 trattamenti all'anno. ► Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro, da intendersi come dose minima; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alla dose per ettolitro. ► Cabrio Duo va applicato preventivamente. ► Si consiglia di usare Cabrio Duo nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie delle colture. ► Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve tra i trattamenti. ► Si consiglia l'impiego di Cabrio Duo nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'aggitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

FITOTOSSICITÀ: Cabrio Duo, su lattuga varietà Trocadero, nei primi giorni dopo il trattamento potrebbe manifestare fenomeni di decolorazione parziale della foglia che scompaiono nei giorni a seguire. Effettuare saggi preliminari.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CIPOLLA, AGLIO E SCALOGNO, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI BASILICO; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta valida dal **2 MAG. 2015** al **8 SET. 2015**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del **12 MAG. 2015**